

Что делать, если обнаружил присосавшегося клеща?

ГЛАВНОЕ НЕ РАЗДАВИТЬ КЛЕЩА!

Необходимо обратиться за медицинской помощью, врач назначит профилактическое лечение. Если возможности обратиться за медицинской помощью нет, то клеща нужно вытащить как можно скорее, но при этом необходимо соблюдать осторожность. Можно вытаскивать его пинцетом или ниткой, обвитой вокруг головы клеща, выкручивающими движениями. В течение 14 дней после присасывания клеща необходимо проводить термометрию два раза в день.

Если врача рядом нет, нужно не медлить, а удалять клеща самостоятельно, так как кровосос вводит в ранку обезболивающее вещество

1 ПАЛЬЦАМИ



Если клещ достаточно насытился и приобрел большой размер, его легче захватить пальцами. Вытягивая его верх скручивая в любую из сторон.

- ❗ Клеща не стоит брать голыми руками, если нет перчаток,
- подойдет полиэтиленовый пакет

2 НИТКОЙ



Нить накладывается на клеща, затягивается у хоботка и скручивается. Затем нужно аккуратно тянуть вверх, пока клещ не выйдет

3 ПИНЦЕТОМ



Захватить клеща как можно ближе к хоботку, затем потянуть вверх, вращая вокруг оси в любую сторону



- ❗ Рану нужно обработать спиртом
- или спиртовым раствором йода



- ❗ Выкидывать клеща не нужно, поместите
- клеща в банку или бутылку



- ❗ Доставьте в поликлинику для исследования,
- а через 10 дней после укуса нужно сдать анализ крови на боррелиоз и энцефалит