

Профилактика гриппа птиц у людей

- Необходимо избегать контакта с дикими и домашними птицами с признаками болезни.
- Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.
- Не покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц.
- Подвергать мясо птиц полноценной термической обработке.
- Тщательно мыть руки или использовать кожные антисептики для гигиенической обработки рук после контакта с птицей.
- При появлении признаков ОРВИ после контакта с птицей обратиться к врачу и сообщить ему о таком контакте.
- Выполнять иммунопрофилактику с применением сезонной вакцины против гриппа для снижения вероятности микст-инфицирования.

Федеральное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр гигиенического
образования населения»
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер.,
д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



Грипп птиц



Грипп птиц

острое вирусное зоонозное заболевание, которое характеризуется выраженной интоксикацией, поражением легких, высокой летальностью.

Источник инфекции

Основной источник – дикие водоплавающие птицы. Вирус высокопатогенного птичьего гриппа может длительно существовать в их организме, не вызывая симптомов.

Дикие водоплавающие птицы – главный источник инфекции для домашних птиц, у которых болезнь протекает тяжело, вызывает массовую гибель (до 90%).

Восприимчивость людей к гриппу птиц низкая

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей, тушками птиц.



Инкубационный период

при инфицировании человека высокопатогенным гриппом птиц инкубационный период составляет от 1 до 7 дней (чаще 2-3 дня)

Симптомы гриппа птиц у человека

- острое начало
- повышение температуры тела до 38°C и выше
- озноб, мышечные и суставные боли, боль в горле
- возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота
- быстрое ухудшение состояния
- появление на 2-3 день болезни признаков пневмонии (влажный кашель, часто с примесью крови, одышка)

Летальность

при заражении человека высокопатогенным гриппом птиц летальность достигает 50-80%



Как выглядит больная птица?

Для заболевших диких и домашних птиц характерны следующие симптомы:

необычное поведение

- дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи),
- угнетенное состояние,
- отсутствие реакции на внешние раздражители,

изменение внешнего вида

- цианоз, опухание и почернение гребня и сережек,

затрудненное дыхание.

