2026 ИДЕАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИММУНИЗАЦИИ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

составлен в соответствии с рекомендациями Союза педиатров России и национальным календарем профилактических прививок*

Союз педиатров России

МАЛЫШИ (дети до 2 лет)

Возраст, мес	0	1	2	3	4–5	6	7	9	12	15	18	20	24
Антитела (пассивная иммунизация)													
Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ)[1]	5 введений с интервалом 1 мес												
Вакцины (активная иммунизация)													
Туберкулез[2]	3–7 дней												
Вирусный гепатит В[3]	V1	V2				V3							
	V1	V2	V3						V4				
Пневмококковая инфекция[4] ⓘ ◆		С 1,5 мес	V1 ПКВ		V2 ПКВ					RV ПКВ			
			V1 ПКВ		V2 ПКВ	V3 ПКВ				RV ПКВ			
Менингококковая инфекция[5] ⓘ ◆		С 1,5 мес	V1–V2/ V1–V3						RV				
Ротавирусная инфекция[6]		С 1,5 мес	V1	V2	V3								
Коклюш[7] ◆				V1^	V2^	V3^					1RV^		
Дифтерия[7] ◆													
Столбняк[7] ◆													
Полиомиелит[8]				V1 ИПВ^	V2 ИПВ^	V3 ИПВ^					1RV ИПВ^	2RV ИПВ/ОПВ	
												2RV ИПВ	
Гемофильная инфекция типа *b* ⓘ				V1^	V2^	V3^					RV^		
Грипп[9] ◆						Ежегодно							
Корь[10]								С 8 мес	V1 ККП/ ККП + В/ ККПВ^				
Краснуха[10]													
Эпидемический паротит[10]													
Ветряная оспа								С 9 мес	V1	V2			
Вирусный гепатит А ◆												V1	
Клещевой вирусный энцефалит ◆													



- Все дети данной возрастной группы
- Догоняющая вакцинация не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика
- Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией
- Дети из групп риска, по показаниям

V1, V2, V3, V4 — порядковый номер вакцинации; **1RV, 2RV, 3RV** — порядковый номер ревакцинации; **^** — преимущественно в составе комбинированных вакцин; **ИПВ** — инактивированная полиомиелитная вакцина; **ККП** — вакцина для профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита; **ККП + В/ККПВ** — вакцины для профилактики кори, краснухи, эпидемического паротита и ветряной оспы; **ОПВ** — оральная полиомиелитная вакцина; **ПКВ** — пневмококковая конъюгированная вакцина 13-валентная или 20-валентная; **ППВ23** — пневмококковая полисахаридная вакцина 23-валентная; **РСВИ** — респираторно-синцитиальная вирусная инфекция.

* Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (с изменениями от 12.12.2023).

ⓘ Схема вакцинации зависит от возраста, в котором введена первая доза.

◆ Возрастные ограничения и схема вакцинации могут различаться в зависимости от препарата.

Союз педиатров России

2026 ИДЕАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИММУНИЗАЦИИ СОЮЗА ПЕДИАТРОВ РОССИИ

составлен в соответствии с рекомендациями Союза педиатров России и национальным календарем профилактических прививок*

ДОШКОЛЯТА И ШКОЛЬНИКИ (дети от 2 до 18 лет)

Возраст, лет	2–3	4–5	6	7	9–11	12–13	14	15–17
Вакцины (активная иммунизация)								
Туберкулез[2]			RV					
Вирусный гепатит B[3]								
Пневмококковая инфекция[4] ⓘ ◆	ПКВ		ПКВ/ППВ23					
Менингококковая инфекция[5] ⓘ ◆							V/RV	
	V/RV							
Коклюш[7] ◆			2RV				3RV	
Дифтерия[7] ◆								
Столбняк[7] ◆								
Полиомиелит[8]			3RV ИПВ/ОПВ					
			3RV ИПВ					
Гемофильная инфекция типа *b* ⓘ								
Грипп[9] ◆	Ежегодно							
Корь[10]			V2 КПК					
Краснуха[10]								
Эпидемический паротит[10]								
Ветряная оспа								
Вирусный гепатит A ◆	V2							
Клещевой вирусный энцефалит ◆								
Папилломавирусная инфекция[11] ⓘ ◆					С 9 лет	V1, V2		
Коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2[12] ◆								

[1] Группы риска: дети до 6 мес жизни, рожденные на 35-й нед гестации (включительно) и ранее; дети до 2 лет, которым требуется лечение по поводу бронхолегочной дисплазии; дети до 2 лет с гемодинамически значимыми пороками сердца и с учетом индивидуальных показаний по решению врачебной комиссии. Введение не зависит от графика вакцинации и традиционного сезона РСВИ.

[2] При отсутствии вакцинации BCG-M (вакцина против туберкулеза) в роддоме до 2 мес жизни вакцинация BCG-M проводится без предварительной пробы Манту. В последующем вакцинация BCG-M может быть выполнена детям до 7 лет после пробы Манту (не позднее 2 нед) при отрицательной ее оценке. Ревакцинация BCG проводится при отрицательной пробе Манту.

[3] Первая, вторая и третья вакцинации против гепатита B проводятся по схеме 0–1–6 (1-я доза — в момент начала вакцинации, 2-я доза — через месяц после первой прививки, 3-я доза — через 6 мес от начала вакцинации), за исключением относящихся к группам риска, вакцинация против вирусного гепатита B которых проводится по схеме 0–1–2–12 (1-я доза — в момент начала вакцинации, 2-я доза — через месяц после первой прививки, 3-я доза — через 2 мес от начала вакцинации, 4-я доза — через 12 мес от начала вакцинации). При использовании многокомпонентных вакцин, включающих компонент против гепатита B, вторая и последующие вакцинации против гепатита B детей не из групп риска могут проводиться по графику, указанному в инструкции по применению конкретной вакцины.

[4] Относящимся к группе высокого риска (например, пациентам с серповидноклеточной анемией, асплений, ВИЧ-инфекцией, хроническим заболеванием легких, сердца, печени, почек или иммунологической дисфункцией и др.) рекомендуется последовательное введение законченной схемы ПКВ с дальнейшей вакцинацией ППВ23 через 12 мес, при необходимости — сокращение интервала до 8 нед.

[5] Применяются не менее чем 4-валентные конъюгированные менингококковые вакцины, содержащие циркулирующие в РФ серогруппы возбудителя, актуальные как причина генерализованных форм менингококковых инфекций.

[6] Вакцинация против ротавирусной инфекции может проводиться с 6-недельного возраста трехкратно с интервалом не менее 4 нед. Если иммунизация начата позже 6-недельного возраста и/или интервал составляет более 4 нед, можно осуществлять введение вакцины Рота-V-Эйд до возраста 24 мес.

[7] Дети, рожденные от матерей, привитых во время беременности против коклюша, дифтерии, столбняка, вакцинируются в соответствии со сроками национального календаря прививок.

[8] Вторую и третью ревакцинацию против полиомиелита следует проводить инактивированной (убитой) полиовакциной детям, относящимся к группам риска: пациентам с болезнями нервной системы; с иммунодефицитными состояниями; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; с ВИЧ-инфекцией; рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным; детям, находящимся в домах ребенка, детских домах, интернатах.

[9] Дети до 3 лет / 9 лет впервые против гриппа вакцинируются двукратно с интервалом 4 нед (в соответствии с инструкцией к вакцине).

[10] При догоняющей вакцинации детей в возрасте старше 6 лет, не привитых ранее или вакцинированных однократно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 мес.

[11] Вакцина ВПЧ2: у подростков с 9 до 14 лет (включительно) — 2-дозовая схема 0–6 мес; в старшем возрасте рекомендуемая схема — 0–1–6 мес. Вакцина ВПЧ4: у подростков с 9 до 13 лет (включительно) — 2-дозовая схема 0–6 мес; в старшем возрасте рекомендуемая схема — 0–2–6 мес.

[12] В первую очередь вакцинации подлежат пациенты с хроническими заболеваниями, уязвимые для тяжелого течения коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится при наличии письменного согласия одного из родителей с последующим оформлением информированного добровольного согласия.